

## Recepty na zaliczenie praktyczne

### I. Roztwory

Rp.  
Mentholi  
Novocaini hydrochloridi  
Benzocaini                   aa   1,5  
Spiritus Vini 70°           ad  50,0  
M.f.sol.  
D.S. Zewnętrznie

Rp.  
Ephedrini hydrochloridi           0,05  
Calcii lactatis  
Natrii benzoatis           aa   1,5  
Aquae                       ad  100,0  
M.f.sol.  
D.S. 2 x dziennie łyżeczkę do herbaty

Rp.  
Acidi salicylici           1,0  
Glyceroli                   10,0  
3% Sol.Acidi borici  
Spir. Vini dil.           aa   100,0  
M.f. sol.  
D.S. Do przecierania chorobowo zmienionej skóry

Rp.  
Iodi                       0,4  
Kalii iodidi   4,0  
Glyceroli   20,0  
Aqua       ad 60,0  
M.f.sol.  
DS. do pędzlowania

Rp.  
Acidi salicylici   2,0  
Rapae olei       ad 100,0  
Mf. sol.  
DS. zewnętrznie  
Krople

## II. Krople

Rp.

Acidi borici 0,1

Glyceroli 2,0

Ethanoli 70<sup>0</sup> ad 10,0

M.f.gtt.

D.S. 2 x dziennie 2 krople do ucha

Rp.

Sol. Papaverini hydrochloridi 0,03/30,0

Belladonnae extr.sicc. 0,05

M.f.gtt

D.S. 2x dziennie 20 kropli

Rp.

Natrii hydrogenocarbonatis 1,0

Glyceroli 10,0

Mf. gtt

DS. 3 x dziennie po 3 krople do lewego ucha

Rp.

Codeini phosphatis

Papaverini muriatici aa 0,2

Trae Adonis vernalis ad 20,0

M.f.gutt.

D.S. 20 kropli 2-3 x dziennie

## III. Mieszanki

Rp.

Codeini phosphatis 0,5

Pyralgini 2,5

Neospasmini 25,0

Aquae ad 50,0

M.f. mixt.

D.S. 2 x dziennie łyżkę stołową

Rp.  
Codeini phosphatis  
Ephedrini hydrochloridi   aa 0,1  
Aquae                           10,0  
Thymi sirupi comp.           40,0  
M.f. mixt.  
D.S. 2 x dziennie łyżeczkę do herbaty

Rp.  
Pepsini                           3,0  
Acidi hydrochloridi 10%   4,0  
Amarae trae.                   5,0  
Sir. Simplicis                   8,0  
Aquae                   ad   100,0  
M.f. mixt.  
D.3 x dziennie łyżeczka do herbaty

Rp.  
Ipecacuanhae extr. sicc       0,1  
Natrii benzoatis               1,0  
Ammoni chloridi               1,0  
Althae sir.                       25,0  
Aqua pur.                       ad 150,0  
Mf. mixt.  
DS. 2x dziennie łyżka stołowa

Rp.  
Codeini phosphatis       0,15  
Phenobarbitali natrici   0,1  
Ephedrini hydrochloridi   0,2  
Sal. Erlemayeri           2,0  
Aqua pur.                   Ad 100,0  
M.f. mixt.  
DS. 1x dziennie łyżka stołowa

#### IV. Emulsje

Rp.  
Emulsionis olei Ricini       10,0/100,0  
Menthae pip. Aetherolei   gtt. 2  
M.f. emulsio  
D.S. Rano i wieczorem łyżkę stołową

Rp.  
Emulsionis olei Rapae 50,0

D.S. Raz dziennie łyżkę stołową

Rp.  
Ammonii hydroxydi sol 5,0  
Acidi oleinici 0,5  
Camphorati olei ad 25,0

M.f. linimentum  
D.S. Do nacierania

Rp.  
Ephedrini hydrochloridi 0,1  
Mentholi 0,2  
Vit. A+D liq 2,0  
Paraffini liq 30,0

Mf. gtt  
DS. krople do nosa

## V. Zawiesiny

Rp.  
Calcii carbonatis 2,0  
Magnesii oxidi 1,0  
Gummi arabici mucilaginis 10,0  
Aquae ad 50,0  
M.f. mixt. agit.  
D.S. 4 x dziennie łyżeczkę do herbaty

Rp.  
Mentholi 0,05  
Dermatoli 0,125  
Talci veneti  
Zinci oxidi  
Glycerini aa 5,0  
Aq. Calcis ad 25,0  
M.f. susp.  
D.S. Zewnętrznie

Rp.  
Zinci oxidi  
Talci                   aa     5,0  
Glyceroli                   5,0  
1% Sol. Acidi borici ad     50,0  
M.f. suspp.

Rp.  
Hydrocortisoni                   0,1  
Talci veneti  
Zinci oxidi  
Glycerini                   aa   5,0  
Aq. purif.                   ad 50,0  
M.f. susp.  
D.S. 2 x dziennie smarować miejsca chorobowo zmienione

Rp.  
Mentholi                   0,05  
Zinci oxidi  
Talci                   aa     10,0  
Glyceroli                   5,0  
1% Sol. Acidi borici ad 50,0  
M.f. puder płynny

## VI. Proszki

Rp.  
Acidi tannici                   0,25  
Acidi borici                   2,5  
Talci  
Zinci oxidi     aa ad   25,0  
M.f. pulv.  
D.S. Zasyпка

Rp.  
Dionini                   0,015  
Papaverini hydrochloridi 0,04  
Novalgini                   0,3  
M.f. pulv. D.t.d N<sup>o</sup>10  
D.S. 3 x dziennie 1 proszek

Rp.  
Metamizoli natrici 0,5  
Extracti Belladonnae sicci 0,01  
M.f .pulv. D.t.d. No 10  
D.S. 3 x dziennie 1 proszek

Rp.  
Belladonnae extr.sicci 2,0  
Papaverini hydrochl. 0,4  
Lactosi 1,0  
M.f. pulv. Div. in part. aeq.No 6  
D.S. 3 x dziennie 1 proszek

Rp.  
Calcii carbonatis ppti 10,0  
Magnesii oxidi aa 15,0  
Bismuthi subcarbonatis 20,0  
Menthae pip. olesacchari 5,0  
M.f. pulv  
D.S. 3 x tyżeczka

Rp.  
Bismuthi subnitratis 2,0  
Magnesii carbonatis 5,0  
Foeniculi oleosacchari ad 10,0  
M.f. pulv.  
D.S. 1 x dziennie po ½ tyżeczki

## VII. Maści

Rp.  
Hydrocortisoni 0,25  
Benzocaini 2,5  
Lanolini anhydrici  
Vaselini albi aa ad 30,0  
M.f. ung,  
D.S. Zewnętrznie

Rp.  
 3% Sol. Acidi borici  
 Eucerini  
 Vaselini albi                   aa ad 50,0  
 M.f. ung.  
 D.S. Zewnętrznie

Rp.  
 Vit. A liq.                   30.000j.m.  
 Ung. Cholesteroli       ad 50,0  
 M.f.ung.  
 D.S. zewnętrznie

Nazwa	zaw. w 1ml	ilość kropli	gęstość [g/ml]	zaw. w 1 kropli
Vitaminum A Hasco	45 000j.m./1ml	28	1,15	0,88 mg 1607 j.m.
Vitaminum A Medana	50 000j.m./1ml	30	1,08	1670 j.m.
Vitaminum A sol. oleosa	1mlnj.m./1g	1 kropla waży ok. 0,035g		34 500 j.m.
Vitaminum A roztw. pomocniczy		1 kropla waży ok. 0,034 g		10 000 j.m.

Rp.  
 Ureae                                   2,5  
 3% Sol. Acidi borici  
 Eucerini  
 Vaselini                   aa ad 50,0  
 M.f.ung.  
 D.S. zewnętrznie

### VIII. Czopki

Rp.  
 Bismuthi subgallatis           0,1  
 Benzocaini                       0,2  
 Cacao olei                       q.s.  
 M.f.supp. anal. D.t.d. N<sup>o</sup>6  
 D.S. 1 czopek na noc

Rp.  
Codeini phosphatis 0,02  
Papaverini hydrochloridi 0,06  
Pyralgini 0,5  
Cacao olei q.s.

M.f. supp. anal. D.t.d. N<sup>o</sup> 6  
D.S. 1 x dziennie 1 czopek

Rp.  
Codeini phosphatis 0,12  
Papaverini hydrochlorici 0,36  
Pyralgini 0,3  
Cacao olei q.s  
M.f. supp. Anal Divide in. Part. Aeq. No 6  
D.S. 1x dziennie czopek

Rp.  
Hydrocortisoni 0,01  
Zinci Oxydi 0,15  
Balsami peruviani  
Bismuthi subgallas aa0,2  
Cacao olei q.s  
M.f. sup. anal. D.t.d No 6  
D.S. 2 x dziennie czopek

Rp.  
Biseptol 0,24  
Nystatini 100 000 j.m.  
Lactosi 0,25  
Cacao olei  
M.f. glob.vag. D.t.d. No 6

Nystatyna – substancja do receptury. Jej ilość w recepcie określa się w j.m.

W recepturze jest w postaci rozcierki.

Lactosum – substancja do receptury

Biseptol = Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum

tabletki Biseptol 120, (100 mg + 20 mg),

tabletki Biseptol 480, (400 mg + 80 mg),

tabletki Biseptol 960, (800 mg + 160 mg)